

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES  
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
ROUTE DE VASLES - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 88.35.55

ABONNEMENT ANNUEL

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
Rte de Vasles - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 63 - JUILLET 1976

## GRANDES CULTURES

### PYRALE DU MAIS

A la suite des quelques pluies de ces derniers jours, on a observé une reprise des captures aux pièges sexuels dans le Poitou. Mais les pontes ont été faibles, et le conseil de non traitement donné dans notre dernier bulletin n'est pas remis en cause.

### Utilisation en fourrage des Maïs traités avec des insecticides

Nous donnons les indications suivantes, élaborées en commun avec le laboratoire de Phytopharmacie de l'INRA, l'ITCF et l'AGPM :

\* Aucune restriction n'est à formuler dans l'utilisation des maïs traités avec le *Bacillus Thuringiensis* ;

\* Autres insecticides : chlorpyrifos, fenitrothion, parathion, phoxime, tetrachlorvinphos ;

- Maïs ensilés : les maïs traités, aux doses normales, avec les insecticides autorisés, peuvent être consommés sans risque par le bétail, après ensilage.

Maïs utilisés en vert : la plupart de ces insecticides, utilisés aux doses normales, ne présentent pas de nocivité pour le bétail. Il est préférable néanmoins d'attendre 15 jours avant la consommation. Ce délai est impératif dans le cas du parathion.

### Consommation des pailles de céréales

Aucune contre indication n'est à signaler si ce n'est, dans le cas de céréales ayant subi un traitement insecticide, l'observation d'un délai de trois semaines entre ce traitement et la consommation.

### Déchaumage des colzas et céréales

Nous rappelons que les meilleurs moyens de lutte contre le phoma lingam (colza) et les virus de la jaunisse nanisante de l'orge (céréales) sont l'enfouissement des résidus de récolte, et l'élimination des repousses.

Il faut donc profiter des orages pour réaliser le plus tôt possible les déchaumages (et même des labours précoces).

## VIGNE

### MILDIOU

La situation n'a pas évolué depuis notre dernier avis : les risques restent extrêmement réduits, surtout dans les zones qui n'ont pas reçu de précipitations importantes. Mais par précaution, on peut envisager un traitement des vignes en situation sensible.

### OIDIUM

Ne pas laisser se développer cette maladie : surveiller les vignes et traiter si nécessaire (soufrages).

ACARIOSE

Les brunissements de feuillage ("acariose bronzée") sont très fréquents dans les charentes. Ces dégâts sont dus à un acarien qu'il faut combattre en employant au besoin un acaricide spécifique.

CICADELLES (Charentes)

Le seuil d'intervention (1 cicadelle par feuille) est atteint dans certains cas, et les symptômes caractéristiques de nécroses marginales peuvent être observés. Intervenir avec: azimphos 40 g/hl, formathion 50, methomyl 37,5, methidathion 30, oxydéméton méthyl 25, parathions 30, phosalone 60.

VERS DE LA GRAPPE (Eudemis)

Dans les Charentes, traiter les vignes où des dégâts ont été notés en première génération (toiles).

Dans le Haut Poitou, le second vol se poursuit, mais les pontes sont encore peu nombreuses : on pourra intervenir à partir du 20 - 25 juillet (localement) mais en règle générale la situation n'est pas préoccupante.

Le Chef de la Circonscription

Les Ingénieurs chargés des  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

F. BARBOTIN

Imprimé à la Station le 16 juillet 1976 - Préc. Note : Bulletin N° 62 - JUILLET 1976 -

N° du papier de presse : 535 AD.